15 QUESTÕES DE SAÚDE PÚBLICA

01-_____ é considerado por muitos como o herói fundador da Epidemiologia por pautar a nascente metodologia epidemiológica. Em investigação sobre a cólera de 1850, ele antecipou uma demonstração da teoria microbiana antes mesmo de Pauster. Assinale, das alternativas abaixo, a que completa corretamente a lacuna.

A. John Snow.
B. Rudolf Virchow.
C. Edwin Chadwick.
D. Pierre-Charles.
E. René Villermé.

02-No modelo biomédico de patologia pode-se afirmar que:

A. As doenças infecciosas são definidas por exclusão.
B. Todos agentes infecciosos das doenças não-infecciosas são de natureza inanimada.
C. Abuso de drogas, acidentes, violência são incluídos na categoria de enfermidades não-infecciosa.
D. Úlcera gástrica, doença de Hodgkin e leucemia são doenças exclusivamente não-infecciosas.
E. Toda doença contagiosa é infecciosa, mas nem toda doença infecciosa é contagiosa.

03-No modelo de Saúde-Doença, as relações do hospedeiro com o bioagente patogênico podem ser descritas pelas seguintes categorias:

A. Resistência, suscetibilidade e imunidade.
B. Imunogenicidade, patogenicidade e resistência.
C. Infectividade, suscetibilidade e resistência.
D. Biopatogenicidade, suscetibilidade, imunidade.
E. Cronicidade, resistência, patogenicidade.

04-"É o sistema de defesa com o qual o organismo impede a difusão ou multiplicação de agentes infecciosos que o invadiram, ou reage aos efeitos nocivos dos seus tóxicos". Esta é a definição de:

A. Resistência
B. Imunidade
C. Cronicidade
D. Imunogenicidade
E. Infectividade

05-A leishmaniose visceral é um tipo de:

A. Anfixenoses
B. Antroponoses
C. Zoonoses
D. Antropozoonoses
E. Zooantroponoses

06-Das alternativas abaixo, assinale a que indica um exemplo de fitonose:

A. Febre titfóide
B. Arbovirose silvestre
C. Arbovirose fitogênica
D. Leshimaniose visceral
E. Blastomicose sul-americana

07-A primeira epidemia documentada clínica e laboratorialmente da dengue no Brasil ocorreu em:

A. 1979-1980, em Luará - Pará, causada pelos sorotipos 1 e 3.
B. 1981-1982, em Boa Vista - Roraima, causada pelos sorotipos 1 e 4.
C. 1983-1984, em Diadema – São Paulo, causada pelos sorotipos 1 e 2.
D. 1989-1990, no Rio de Janeiro – Rio de Janeiro, causada pelos sorotipos 2 e 3.
E. 1986-1987, em Cabrobó - Pernambuco, causada pelos sorotipos 1 e 4.

08-No Brasil, a Campanha de Erradicação da Varíola – CEV é reconhecida como marco da institucionalização das ações de vigilância no país, tendo fomentado e apoiado a organização de unidades de vigilância epidemiológica na estrutura das secretarias estaduais de saúde. Esta campanha se deu em:

A. 1957-1965
B. 1966-1973
C. 1968-1977
D. 1977-1981
E. 1962-1969

09-Nas doenças infecciosas, os objetos contaminados que servem como meio de transmissão recebem o nome de:

A. Agressores
B. Fômites
C. Invasores
D. Introdutores
E. Patogênicos

10-Sobre a Lei Eloy Chaves é INCORRETO afirmar:

A. Foi aprovada em 1923.
B. É considerada marco inicial da previdência social no Brasil.
C. Política de saúde: Instituíram-se as Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAP's) que deveriam ser organizadas por empresas.
D. Para o operário urbano criou-se socorros médicos, medicamentos por preços baixos, aposentadoria, pensão para herdeiros em caso de morte.
E. Na década de 60 criou-se os Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs).

11-As ações do Pacto em Defesa do SUS devem contemplar, EXCETO:

A. Articulação e apoio à mobilização social pela promoção e desenvolvimento da cidadania, tendo a questão da saúde como um direito.
B. Estabelecimento de diálogo com a sociedade, além dos limites institucionais do SUS.

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br

C. Ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, em especial com os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania.
D. Elaboração e publicação da Declaração dos Direitos e Deveres do Exercício da Cidadania no SUS.
E. Aprovação do orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o compromisso único nas ações e serviços de saúde, de acordo com a Constituição.

12-Um dos sistemas mais relevantes para a atenção básica é o: Sistema de Informação da Atenção Básica (Siab) que é utilizado pela atenção básica, é um sistema que permite agregar e processar informações sobre a população visitada. No entanto, parte dos seus instrumentos pode ser usada por outros modelos de atenção. O sistema pode fornecer as seguintes informações, EXCETO:

A. Notificações.
B. Número de gestantes adolescentes cadastradas.
C. Captação de adolescentes gestantes, por trimestre, para o pré-natal.
D. Óbitos de adolescentes por causas externas (incluindo mortes violentas).
E. Sistema de Gerenciamento da Unidade Emergencial Básica (Sigeb).

13-Quanto a Regionalização é INCORRETO afirmar:

A. Organização dos serviços de saúde em cada região para que a população tenha acesso a todos os tipos de atendimento.
B. É uma das diretrizes que orientam a organização do SUS.
C. Representa a articulação entre os gestores estaduais e municipais na implementação de políticas, ações e serviços de saúde qualificados e descentralizados.
D. Garante acesso, integralidade e resolutividade na atenção à saúde da população.
E. Visa imprimir maior eficácia, eficiência e equidade ao sistema através de maior racionalização no uso dos serviços de saúde, a ser alcançada através da organização e articulação regional da oferta e do acesso aos serviços em seus diferentes níveis de complexidade.

14-Sobre a Reforma Sanitária é INCORRETO afirmar:

A. O movimento da Reforma Sanitária representou uma mudança de paradigma na saúde pela abrangência dos determinantes sociais no processo saúde e doença.
B. Se deu na construção do paradigma denominado medicina social ou saúde coletiva, organizado a partir das noções de determinação social do processo saúde-doença.
C. Na saúde, nos anos 70, o movimento de Reforma Sanitária contribuiu na implantação do Sistema Único de Saúde, que visava assegurar, através de seus princípios, os direitos sociais.
D. O processo da Reforma Sanitária brasileira acabou por desembocar na 8ª Conferência Nacional de Saúde (1986), e permitiu que a afirmativa contida em seu relatório final assegurando a saúde como direito de todos e dever do Estado fosse incorporada pela constituinte na Constituição Federal Brasileira de 1988.
E. O acesso à saúde como direito de cidadania foi regulamentado pela Lei n. 8080 de 1990 e pela Lei n. 8142, do mesmo ano, que determinou a participação e o controle da comunidade, e o repasse de recursos. Desde então, a saúde teve vários avanços.

15-São atribuições do SUS (art. 200, CF/ 1988), EXCETO:

A. Participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
B. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, exceto as de saúde do trabalhador.
C. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
D. Incrementar desenvolvimento científico e tecnológico em sua área de atuação.
E. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16-Na ficha de atendimento ambulatorial (FAA), devem ser preenchidos os dados básicos da produtividade ambulatorial, em campos contendo informações como, exceto:

A. Unidade prestadora da assistência.
B. Identificação do usuário.
C. Descrição do atendimento.
D. Código dos procedimentos do SIAB/SUS.
E. Motivo, descrição e diagnóstico/CID.

17-Cinzéis são utilizados principalmente para planificar e clivar o esmalte, podendo se apresentar em diferentes fórmulas e angulações. O que tem o intermediário e a lâmina ligeiramente curvos e é um dos mais versáteis dos instrumentos manuais de corte, servindo para diferentes propósitos é denominado:

A. Cinzéis retos.
B. Cinzéis monoangulados.
C. Cinzéis biangulados.
D. Cinzéis triangulados.
E. Cinzéis Wedelstaed.

18-Enxadas são muito semelhantes aos cinzéis diferenciando-se destes por apresentar ângulo da lâmina até próximo de 250 centesimais. Quando a angulação da lâmina for menor que _____ centesimais, o instrumento pode ser considerado como cinzel.
A alternativa que preenche corretamente a lacuna é:

A. 10,80
B. 11,60

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br

C. 12,50
D. 13,40
E. 14,50

19-De acordo com Mondelli, independente de qual a técnica utilizada para afiação de Instrumentos Cortantes Manuais, alguns princípios básicos devem ser observados, dos quais NÃO se inclui:

A. Estabelecer bisel adequado antes de iniciar a afiação e manter o instrumento fixo, em posição correta, durante todo o procedimento.
B. Manter a pedra lubrificada com uma fina camada de óleo pouco fluido.
C. Usar pouca pressão contra a pedra para evitar o desenvolvimento de calor por atrito.
D. Usar, sempre que possível, uma guia para orientar o plano de desgaste do instrumento.
E. Conservar as pedras de afiar limpas e livres de equírolas de metal.

20-O período e as concentrações em que os carboidratos permanecem na boca após uma refeição são de grande importância.
As guloseimas como goma de mascar, bombons, chocolates, caramelos, toffees, pastilhas de hortelã e biscoitos doces, que têm altas concentrações de sacarose, o tempo de desaparecimento dessas substâncias da cavidade bucal pode se prolongar por aproximadamente:

A. 5 minutos.
B. 10 minutos.
C. 40 minutos.
D. 60 minutos.
E. 120 minutos.

21-Indique o procedimento correto para se realizar uma limpeza no ambiente odontológico.

A. Limpar as paredes de baixo para cima, em sentido único.
B. Esfregar as paredes com água e sabão, não utilizando esponja ou pano.
C. Enxaguar com pano umedecido em um balde com água limpa.
D. Limpar os pisos da porta para o fundo.
E. Secar com um pano úmido envolto no rodo.

22-Referente ao risco de infecção, são objetos e instrumentos considerados críticos em ambientes odontológicos, EXCETO:

A. Ampolas de vidro
B. Brocas
C. Limas endodônticas
D. Pontas diamantadas
E. Moldeiras

23-Na Técnica de Bass deve-se inicialmente colocar a escova de que forma?

A. Em ângulo de 45 graus com o eixo longitudinal do dente.
B. Aplicar a cabeça da escova sobre o dente em ângulo de 45 graus com o plano oclusal.
C. Em ângulo de 45 graus com o eixo vertical do dente.
D. Aplicar a cabeça da escova sobre o dente em ângulo de 65 graus com o plano oclusal.
E. Em ângulo de 65 graus com o eixo longitudinal do dente.

24-

A figura demonstra:

A. Fratura de dentina, apenas.
B. Fratura de esmalte, apenas.
C. Fratura de esmalte e dentina.
D. Fratura de dentina e polpa.
E. Fratura de esmalte, dentina e polpa.

25-Sobre o Tabagismo é INCORRETO afirmar:

A. As substâncias relacionadas ao cigarro (nicotina, monóxido de carbono e cianeto de hidrogênio) podem agir como vasodilatadores, o que resulta em isquemia do tecido, redução da resposta inflamatória e do reparo celular.
B. O progresso da doença periodontal é duas vezes mais rápido em fumantes do que em não-fumantes.
C. O fumo intenso de cigarros pode levar ao escurecimento da gengiva onde o ar aquecido é aspirado, na maioria das vezes na gengiva vestibular anterior.
D. Fumo intenso também pode levar à leucoplasia.
E. O ato de fumar irá afetar o resultado do tratamento após a raspagem, o alisamento radicular, cirurgia de retalho e terapia periodontal regenerativa.

26-No cálculo das porcentagens de faces com placa, o índice aceitável é de:

A. 30%.
B. 35%.
C. 40%.
D. 45%.
E. 50%.

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br

27-Os principais fatores de risco do câncer de boca são, EXCETO:

A. O uso crônico de álcool e tabaco associados potencializa drasticamente o risco de aparecimento do câncer de boca.
B. Exposição à radiação solar.
C. Má higiene bucal.
D. Uso de próteses dentárias mal-ajustadas.
E. Deficiência nutricionais (adquiridas ou congênitas).



28- Indique a sequência correta:

A. 1 - Dentina, 2 - gengiva, 3 - raiz, 4 - esmalte, 5 - coroa, 6 - polpa.
B. 1 - Coroa, 2 - gengiva, 3 - polpa, 4 - dentina, 5 - esmalte, 6 - raiz.
C. 1 - Coroa, 2 - gengiva, 3 - raiz, 4 - esmalte, 5 -dentina, 6 - polpa.
D. 1 - Coroa, 2 - polpa, 3 - raiz, 4 - dentina, 5 - esmalte, 6 - gengiva.
E. 1 - Coroa, 2 - gengiva, 3 - raiz, 4 - polpa, 5 - esmalte, 6 - dentina.

29-Quanto ao avental não cirúrgico e calça é INCORRETO afirmar:

A. O avental não cirúrgico e a calça, elementos do uniforme para procedimentos semi-críticos, devem ter obrigatoriamente a cor branca.
B. Após o dia de trabalho este uniforme deve ser descartado em saco plástico para roupa suja.
C. O profissional deve lembrar que a calça e o avental não estéril são de uso exclusivo do consultório e não devem ser usados fora deste local.
D. O avental não cirúrgico, de preferência, deve ter gola alta do tipo "gola de padre", com mangas longas e comprimento de ¾ com punhos em elásticos.
E. Ele pode ser confeccionado em algodão ou polipropileno.

30-Os dentes caninos tem em média o comprimento de:

A. 12 a 15mm.
B. 14 a 17mm.
C. 14 a 20mm.
D. 24 a 27mm.
E. 12 a 24mm.

31-São características do Peróxido de Hidrogênio, EXCETO:

A. Conhecido como Água Oxigenada.
B. Exerce poder anti-séptico.
C. Tem o objetivo de eliminar restos sanguíneos pulpares.
D. É mais utilizado para auxiliar no preparo de canal radicular.
E. Favorece a hemostasia.

32-O isolamento absoluto é um método simples e rápido de ser aplicado; eficaz no isolamento de um dente até em casos de maior dificuldade.
Quando adequadamente colocado, o seu uso proporciona, EXCETO:

A. Prevenção de contaminação do campo cirúrgico por saliva, sangue ou outros fluidos tissulares.
B. Manutenção da cadeia de assepsia em quase todas as fases do tratamento.
C. Permite um campo operatório seco, limpo e passível de desinfecção.
D. Reduz significativamente a possibilidade de infecção cruzada.
E. Protege o paciente contra a aspiração ou deglutição de detritos, fragmentos de dente ou de restaurações, de instrumentos endodônticos ou brocas, fármacos ou substâncias químicas auxiliares de alto poder irritante utilizadas localmente durante o tratamento.

33-Sobre os Grampos endodônticos é INCORRETO afirmar:

A. Funcionam mantendo o lençol de borracha em posição estável junto aos dentes.
B. Existem no comércio vários tipos de grampos endodônticos destinados ao uso em grupos dentais específicos.
C. Devem ser escolhidos de acordo com a anatomia do colo anatômico do dente no qual serão colocados.
D. Estes grampos podem ser com ou sem asas ou aletas.
E. A numeração dos grampos é universal, não podendo ser atribuídas pelos fabricantes de maneira própria.

34-No que diz respeito ao processamento do filme, devem ser seguidas as recomendações do fabricante com respeito à concentração da solução, temperatura e tempo de revelação. Além disso, deve ser afixada na parede da câmara uma tabela de tempo e temperatura de revelação e a temperatura do revelador deve ser medida antes da revelação. Os seguintes procedimentos também devem ser observados sobre os quais é INCORRETO afirmar:

A. As soluções devem ser regeneradas ou trocadas quando necessário, de acordo com as instruções do fabricante.
B. Não devem ser utilizados filmes ou soluções de processamento com prazo de validade expirado.
C. Deve ser realizada uma inspeção visual simples do filme durante os processamentos manuais.
D. A câmara escura e as cubas de revelação devem ser mantidas limpas.

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br

E. Os filmes devem ser armazenados em local protegido do calor, umidade, radiação e vapores químicos.

35-O instrumental esterilizado deve ser armazenado em local exclusivo, separado dos demais, em armários fechados, protegido de poeira, umidade e insetos, e a uma distância mínima de:

A. 50 cm do chão, 50 cm do teto e 5 cm da parede.
B. 20 cm do chão, 30 cm do teto e 10 cm da parede.
C. 30 cm do chão, 30 cm do teto e 10 cm da parede.
D. 20 cm do chão, 50 cm do teto e 5 cm da parede.
E. 50 cm do chão, 30 cm do teto e 5 cm da parede.

36-São recomendações básicas de higiene dentaria que devem ser feitas ao paciente no seu Pós-Operatório, EXCETO:

A. Manter a higiene oral de costume, com o uso de escova e fio dental.
B. Não realizar bochechos.
C. Não ingerir alimentos sólidos ou quentes; dar preferência a alimentos frios ou a temperatura ambiente, com consistência líquida ou pastosa, pelo menos nas primeiras 48 horas pós-cirúrgicas.
D. Fazer uso de gelo extra bucal (bolsa de gelo) no período pós-extração (durante as primeiras 48 horas).
E. Fazer repouso relativo nas primeiras 24 horas.

37-Sobre as manifestações bucais pelo HIV é INCORRETO afirmar:

A. As manifestações bucais pelo HIV são comuns e podem representar os primeiros sinais clínicos da doença.
B. As lesões bucais, quando detectadas, podem ajudar tanto no diagnóstico precoce quanto na instituição de medidas profiláticas e terapêuticas que podem aumentar a sobrevida dos usuários.
C. Deve-se observar, em especial: a candidíase, a leucoplasia pilosa e o sarcoma de Kaposi, que são alterações consideradas marcadores bucais de comprometimento imunológico do usuário.
D. O tratamento do usuário deve ser baseado na situação clínica e este deve receber informações sobre os problemas bucais e as indicações de tratamento. Estas indicações devem ser feitas por toda a equipe de saúde, em comum acordo com o usuário.
E. Portadores do Vírus HIV apresentam risco elevado para o aparecimento de doença periodontal de evolução lenta e geralmente há uma boa resposta ao tratamento de rotina (raspagens e polimentos). Enxágüe com solução antibacteriana (cetoconazol) pode reduzir o risco de complicações sistêmicas se realizado antes e após estes procedimentos.

38-A candidíase é a infecção fúngica mais comum que acomete a cavidade bucal. Qual é a espécie mais freqüentemente isolada e associada com doença?

A. Candida krusei.
B. Candida parakrusei.
C. Candida lusitaneae.
D. Candida albicans.
E. Candida tropucalis.

39-Sobre higiene bucal em crianças é INCORRETO afirmar:

A. A limpeza da cavidade bucal é normalmente iniciada antes mesmo da erupção dental. Usa-se um tecido limpo ou gaze embebida em água filtrada ou soro para esfregar a gengiva.
B. A escovação está indicada a partir da erupção do primeiro dente decíduo, não é necessário uso de dentifrício devido à possibilidade de ingestão pelo bebê.
C. A partir da erupção dos primeiros molares decíduos pode-se usar o mínimo possível de dentifrício (quantidade equivalente a um grão de feijão cru).
D. Um cuidado particularmente importante é a freqüência do uso do creme dental, pois acontece ingestão do mesmo nessa idade, podendo causar fluorose.
E. O dentifrício deve ser mantido fora do alcance das crianças.

40-O vírus da Hepatite viral do tipo B (HBV), em temperatura ambiente, pode sobreviver em superfícies por períodos de até:

A. 12 horas.
B. 24 horas.
C. 48 horas.
D. Uma semana.
E. Duas semanas.

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br